

**CÓDIGO:** 4/218

**TÍTULO:** DIAGNOSTICO CLÍNICO EFICAZ EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LESIONES CUTANEAS PRODUCIDAS POR HONGOS

## AUTORES:

1. Antonia María Perejón Fernández, R2 en MFyC, CS Luis Taracido, Bollullos par del Condado (Huelva)
2. Amalia Filella Sierpes, Médico especialista en MFy C, Tutora, CS Luis Taracido, Bollullos par del Condado (Huelva)
3. Ángela Delgado Cerpa, R1 en MFyC, CS Luis Taracido, Bollullos par del Condado (Huelva)

## CASO CLÍNICO

### Motivo de consulta

Paciente de 25 años que acude a consulta por presenta de lesión cutánea en palma de la mano izquierda de 5 meses de evolución.

### Enfoque individual (anamnesis, exploración, pruebas complementarias)

Nos refiere que la lesión ha presentado periodos de mejoría durante los 5 meses, pero que nunca ha llegado a desaparecer por completo. Refiere que no ha seguido tratamiento alguno para la mencionada lesión. No refiere fiebre. Al interrogar al paciente acerca de manipulación de rosales como poda de los mismos o por hecho de haberse clavado una púa de algún vegetal, el paciente nos responde, que justo 5 días antes de haber presentado la lesión, fue a la playa y se clavó la hoja de un pino. Exploramos al paciente, el cual a nivel de mano izquierda en paciente presentaba una lesión compatible con una placa eritematosa en cuyo interior se podían distinguir pápulas con contenido purulento.

### Enfoque familiar y comunitario

Se trata de un paciente varón, independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Es albañil de profesión. Vive con su pareja.

### Palabras clave

Esporotricosis, sporothrix Schenckii, itraconazol.

### Juicio Clínico

Esporotricosis

### Plan de Acción y Evolución

Instauramos tratamiento del paciente con itraconazol 100 mg cada 24 hr durante 3 meses y citamos transcurridos 7 días para reevaluar. A los 7 días, se aprecia notable mejoría clínica, con prácticamente desaparición total de las lesiones presentadas.

### Conclusiones

La Esporotricosis es una enfermedad infecciosa de forma que un diagnostico precoz de estos procesos permite garantizar al paciente un tratamiento rápido, evitándole complicaciones locales y por supuesto, y aunque se den en el menor de los casos, el desarrollo y progresión a una esporotricosis diseminada.

