



JORNADAS ANDALUZAS PARA RESIDENTES y TUTORES DE MFyC

24, 25 y 26 DE MARZO

FORMATO VIRTUAL



Código: 4/276

Título: DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS

Autores:

1. Clara Calderón Landete MIR 1 MFyC. CS Alcázar 1 (Alcázar de san Juan)
2. Rafaela Martínez López MIR 1 MFyC. CS Alcázar 1 (Alcázar de san Juan)
3. Victor José Morales Marín. Especialista en MFyC. CS Alcázar 1 (Alcázar de san Juan)

Caso Clínico

MOTIVO DE CONSULTA

Lesión crónica cutánea

ENFOQUE INDIVIDUAL (ANAMNESIS , EXPLORACIÓN, PRUEBAS COMPLEMENTARIAS)

Antecedentes personales

Varón de 39 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. No hábitos tóxicos.



Anamnesis

Refiere lesión crónica en cara interna del muslo derecho que ha aumentado de tamaño en el último mes. No refiere dolor, prurito ni signos inflamatorios.

Exploración

Se observa lesión marronácea-parduzca mal delimitada, de 63x31 mm, superficie irregular, elástica y móvil.

Ecografía en Atención Primaria

Lesión en tejido subcutáneo sin extensión profunda.

JUICIO CLÍNICO

Dermatofibrosarcoma protuberans .DD: Queloide, linfoma cutáneo.

PLAN DE ACCIÓN Y EVOLUCIÓN

Se solicita valoración por Teledermatología, sugiriendo el diagnóstico de Dermatofibrosarcoma Protuberans. Se cita al paciente de forma presencial y se realiza biopsia , que confirma el diagnóstico . Previamente a la cirugía se realiza estudio de extensión con TC y RM ,descartándose afectación sistémica. Se deriva al paciente al HGUCD para extirpación de la lesión mediante cirugía de Mohs.

CONCLUSIONES

Existen ciertas patologías dermatológicas que son menos frecuentes. Es importante observar los cambios y modificaciones (color, tamaño, aspecto) de lesiones crónicas cutáneas y consultar en ese caso.

PALABRAS CLAVE

Dermatofibrosarcoma protuberans.